

НАМ'ОДУТ ЛЕЧЕБНИ ОБОЖИВЕНИ

И. А. ПЕТУХОВ, А. Ф. КОТОВИЧ (Витебск)

За последние три года (1972-1974 гг.) в ожоговом отделении Витебской областной больницы находилось на лечении 585 больных, из них 50,7% приходится на детей в возрасте до 14 лет и 14,9% - на лиц старше 50-летнего возраста.

Общая площадь ожогов до 10% поверхности тела была у 52% больных, от 11 до 20% - 27% пострадавших, от 21 до 30% - 8%; от 31 до 40% - 6% и свыше 40% - 7%. Поверхностные ожоги (I и II ст.) наблюдались у 71,6% обожженных, глубокие ожоги (III и IV ст.) были у 21,7% больных, ожоговые деформации - у 6,7% пациентов.

Ожоговый шок отмечен у 9,2% больных. Средний койко-день пребывания больных в стационаре с ожогами II-III степени составил 13,7.

Оказание помощи больным, поступившим в отделение шок, в

обожженным, имеющим глубокие ожоги, осуществлялось на основе современных принципов консервативного и оперативного лечения с применением комплекса используемых средств. В результате этого летальность составила 3,8% (20 человек), в том числе 6 человек погибли в стадии шока; 10 - в стадии токсемии и 4 - в стадии септикотоксемии.

Организация специализированного отделения положительно сказалась и на сроках лечения больных с обширными глубокими ожогами, которые уменьшились на 41 день по сравнению с периодом до организации отделения. Улучшились также значительно и функциональные результаты.