

**О СОЗДАНИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИТОНИТОВ
И.А.Петухов (Витебск)**

До настоящего времени нет единой общепринятой классификации послеоперационных перитонитов. В основу ее различные авторы кладут разные принципы: клинический, патологоанатомический, этиологический и т.д. Существующие классификации или слишком кратки и не отражают всего многообразия послеоперационных перитонитов, или слишком громоздки. Все это затрудняет объективное изучение результатов лечения послеоперационных перитонитов. Предложенная нами классификация учитывает многие аспекты возникновения и развития послеоперационных перитонитов (таблица). Она оказалась целесообразной и ее можно использовать в научной литературе и практической деятельности хирургов, акушеров-гинекологов и других специалистов, оперирующих на органах брюшной полости.

**Классификация послеоперационных
перитонитов**

А. По происхождению

- | | |
|---|--|
| I. Перитониты в связи с плановыми операциями | II. Перитониты в связи с экстренными операциями |
|---|--|

Б. По механизму развития

- I. Первичные** ("перитониты при держащих швах")
- а) инфицирование эндотоксической инфекцией
 - б) инфицирование экзогенной инфекцией
- II. Вторичные** (в связи с недостаточностью швов полых органов, их некрозами, гнойно-воспалительными процессами в брюшной полости и др.)

В. По клиническому течению

- | |
|--|
| I Стертый, атипично, вяло протекающие |
| II Острые |

Г. По этиологическим факторам

- | |
|-----------------------|
| I Микробные |
| II Асептически |

Д. По распространению

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| I Ограниченные | II Разлитые |
| II Местные | III Общие |

Е. По характеру экссудата

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| I Серозно-фибринозные | III Гнойные |
| II Фибринозно-геморрагические | IV Желчные |
| III Фибринозно-гнойные | VI Каловые |