

С.И. Белов
ГЕОГРАФИЯ БЕЗБЕДНОСТИ В БЕЛОРУССИИ
(Витебск)

Активные очаги безбедности на территории Белоруссии существуют много лет. Они расположены в местах обитания диких животных. В последние 20 лет снизилась заболеваемость сельскохозяйственных животных (лошади, крупный рогатый скот, овины). Ввиду их стойлового содержания, выпаса на открытых пастбищах и сокращения численности волков. Возросло безбедство диких животных (лисица, енот), численность которых увеличилась. Они являются основным источником инфицирования вирусом безбедности домашних и сельскохозяйственных животных. Нарастание безбедства диких животных обусловлено распространением эпизоотия у лисиц в соседних республиках и ряде стран Европы.

Случаи безбедности волков сравнительно редки, но их нападения сопровождаются опасными укусами большого числа людей и животных: Поставский район - 22 человека (1957г.); Дзвинский, Сенненский и Оршанский - 26 человек (1978г.) и др.

Мы обработали 3484 случая безбедности животных в Белоруссии (1958-1984г.г.). Распространение больных животных по областям и районам неодинаково. Число больных животных на 100 км² территории БССР равно 1,2. В Брестской области 0,98 (9,1% от всех заболевших животных), Витебской - 1,35 (15,5%), Гомельской - 1,35 (15,7%), Гродненской - 2,4 (17,2%), Минской и г. Минске - 2,1 (25,2%), Могилевской - 2,1 (16,3%). 59,7% больных животных учтено в трех центральных областях характеризую-

иных холмистым рельефом, изрезанным оврагами, балками, ручьями. Высокие показатели бедности животных и в отдельных районах этих областей: Омьянском, Слонимском, Дзержинском, Любанском, Белявичском, Кировском, Кельмичском.

Лесисто-холмистые и овражно-кустарниковые участки обычно являются местами обитания и наладения на животных и людей лисицы, енота, волка, барсука и др. Составлен график, показывающий прямую высокую взаимосвязь бедности животных с рельефом местности. Методом квадратов вычислен коэффициент корреляции связи $\chi_{xy} = +0,81$.