

**МАГНИТОТЕРАПИЯ ТРОМБОБЛИТЕРИРУЮЩИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
КОНЕЧНОСТИ**

Н. Г. Карташов, А. М. Демецкий, С. П. Маяк
Витебск

У больных, страдающих тромбоблитерирующими заболеваниями периферических сосудов, применено локальное

воздействие постоянного и переменного магнитных полей напряженностью от 100 до 300 эрстед с лечебной целью.

Больные разделены на группу страдающих облитерирующим энтеритом, облитерирующим атеросклерозом и больных с посттромбофлебитическим синдромом в стадии компенсации и декомпенсации.

Магнитотерапия выполнялась специально сконструированным аппаратом.

Конструкцией аппарата предусмотрено погружение конечности внутрь соленоида, где создается подвижное магнитное поле напряженностью от 100 до 300 эрстед с направлением силовых линий вдоль конечности. При лечении больных с облитерирующими заболеваниями артерий магнитные силовые линии направлены от центра к периферии, а у больных с венозной патологией — от периферии к центру. Длительность процедуры возрастала от 5 минут до 20 минут. У больных с окклюзионными заболеваниями периферических артерий процедура составляла 20—25 сеансов, у больных с посттромбофлебитическим синдромом — 15—20 сеансов.