

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ОТХОЖДЕНИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Лызиков Н. Ф.

Кафедра акушерства и гинекологии

Литературные данные о продолжительности родов при преждевременном отхождении околоплодных вод разно- речивы.

Мы изучили продолжительность родов 2831 женщины с преждевременным вскрытием плодного пузыря (1492 — первородящих, 1339 — повторнородящих; срочных родов — 2587, преждевременных — 244) и 1889 рожениц при своевременном отхождении околоплодных вод (992 — первородящих, 897 — повторнородящих; срочных родов — 1818, преждевременных — 71).

Средняя продолжительность родов при преждевременном отхождении околоплодных вод меньшая (11 час. $41,4 \pm 11,01$ мин., в том числе первого периода родов — 10 час. $39,8 \pm 10,95$ мин., второго — $35,9 \pm 0,72$ мин., третьего — $25,07 \pm 0,54$ мин.), чем при своевременном вскрытии плодного пузыря (13 час. $53,4 \pm 12,00$ мин., в том числе первого периода — 13 час. $0,4 \pm 11,70$ мин., второго — $30,4 \pm 0,65$ мин., третьего — $22,7 \pm 0,32$ мин.). Это укорочение акта родов при преждевременном отхождении вод происходит за счет периода раскрытия. Продолжительность периода изгнания и последового периода родов при преждевременном вскрытии плодного пузыря большая, чем при своевременном.

У первородящих при преждевременном отхождении вод средняя продолжительность родов составила 13 час. $31,8 \pm 16,4$ мин. (первый период — 12 час. $14,7 \pm 17,29$ мин., второй — $50,3 \pm 0,97$ мин., третий — $26,8 \pm 0,49$ мин.), а при своевременном вскрытии плодного пузыря — 17 час. $9,00 \pm 18,5$ мин. (первый период — 16 час. $2,6 \pm 17,3$ мин., второй — $43,1 \pm 0,9$ мин., третий — $23,3 \pm 0,41$ мин.).

Средняя продолжительность родов у повторнородящих была при преждевременном вскрытии плодного пузыря 8 час. $31,8 \pm 12,39$ мин. (первый период — 7 час. $47,3$ мин., второй — $19,8 \pm 0,46$ мин. и третий — $24,7 \pm 1,08$ мин.), тогда как при своевременном отхождении вод — 10 час. $17,4 \pm 12,3$ мин. (первый период — 9 час. $39,5 \pm 11,5$ мин., второй — $15,9 \pm 0,57$ мин., третий — $22,0 \pm 0,5$ мин.).

При срочных родах с преждевременным отхождением вод средняя продолжительность родов составила 11 час. $22,8 \pm 11,78$ мин. (первый период — 10 час. $20,23 \pm 11,37$ мин., второй — $37,0 \pm 0,71$ мин., третий — $25,57 \pm 0,36$ мин.), а при своевременном вскрытии плодного пузыря — 13 час. $58,8 \pm 12,67$ мин. (первый период — 13 час. $5,5 \pm 12,2$ мин., второй — $30,9 \pm 0,66$ мин., третий — $22,4 \pm 0,31$ мин.).

Средняя продолжительность преждевременных родов была при преждевременном вскрытии плодного пузыря 9 час. $1,8 \pm 35,28$ мин. (первый период — 8 час. $17,66 \pm 35,8$ мин., второй — $25,9 \pm 1,95$ мин., третий — $28,24 \pm 1,34$ мин.), при своевременном отхождении околоплодных вод — 11 час. $22,8 \pm 51,5$ мин. (первый период — 10 час. $32,4 \pm 54,59$ мин., второй — $21,0 \pm 2,23$ мин., третий — $29,4 \pm 3,88$ мин.).

Таким образом, при преждевременных родах статистически достоверной разницы общей продолжительности родов и отдельных периодов их у женщин с преждевременным и своевременным отхождением околоплодных вод не отмечается.

Средняя продолжительность родов 2511 женщин, которым родовозбуждение при преждевременном вскрытии плодного пузыря не применялось, составила 11 час. $4,8 \pm 10,99$ мин. (первые роды — 11 час. $43,4 \pm 17,77$ мин., повторные — 7 час. $25,8 \pm 11,85$ мин., срочные — 11 час. $0,6 \pm 11,58$ мин., преждевременные — 9 час. $31,8 \pm 42,91$ мин.).

Среди 339 женщин с преждевременным отхождением околоплодных вод, которым проводилась стимуляция родовой деятельности, средняя продолжительность родов была 11 час. $37,8 \pm 45,58$ мин. (первые роды — 13 час. $42,0 \pm 16,31$ мин., повторные — 8 час. $54,6 \pm 55,12$ мин., срочные — 12 час. $9,0 \pm 15,06$ мин., преждевременные — 6 час. $46,2 \pm 32,47$ мин.). Следовательно, при срочных

родах стимуляция родовой деятельности не уменьшает средней продолжительности родов. Родовозбуждение в связи с преждевременным отхождением околоплодных вод при недоношенной беременности сокращает продолжительность родов.

Зависимости между длительностью родового безводного периода и продолжительностью родов не наблюдается. Число предшествующих родов, время суток, в которое преждевременно отошли околоплодные воды, время начала родовозбуждения после преждевременного отхождения вод не оказывают существенного влияния на продолжительность родов.