

КОЖЕНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

УДК 616.516.5-08

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕННЫМ НЕЙРОДЕРМИТОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ СИНЛАРА И ЛОКАКОРТЕНА

А.Н.Богданович, В.М.Козин (Витебск)

Предложен метод лечения больных ограниченным нейродермитом с помощью ультрафиолетового синлара и локакортена.

Под наблюдением находились 24 больных. Лечение проводилось в основном амбулаторно. На очаг поражения наносился мазь синлар или локакортен и проводилось излучение в непрерывном режиме, ланольно, интенсивностью 0,2-0,6 вт/см², экспозиция 3-8 минут. Положительный эффект отмечен у 22 больных, в среднем после 10 процедур (у 16 больных - клиническое выздоровление, у 6 - значительное улучшение и улучшение). Характерно уменьшение зуда после 2-3 процедур, а в последующем рассасывание инфильтрации и лихенизации. На курс лечения требуется один тюбик синлара или локакортена. Осложнений и побочных явлений при применении данного метода терапии не наблюдалось.

Рекомендуемый метод ультрафиолетового синлара и локакортена при лечении больных ограниченным нейродермитом прост в применении, эффективен, приводит к сокращению сроков лечения в 1,5-2 раза по сравнению с другими методами терапии, мазей синлар и локакортен расходуется в 3-4 раза меньше. Данный метод лечения внедрен в физиотерапевтический кабинет Витебского областного кожно-венерологического.