

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГРИЗЕОФУЛЬВИН В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ТРИХОМИКОЗАМИ

Нами проведено лечение отечественным гризеофульвином 75 больных трихомикозами. Среди них детей (от 1 года до 14 лет) — 59, взрослых — 16. Больных поверхностной трихофитией было 55 человек, хронической трихофитией — 15, фавусом — 4, хронической трихофитией в сочетании с фавусом — 1 больная.

Препарат назначался внутрь во время еды: взрослым 4 раза в день по 0,25 г, детям до 3 лет — по 0,25 г в сутки (в два приема), от 4 до 6 лет — по 0,25 г 2 раза в день, от 7 и старше — по 0,25 г 3 раза в день. Во время лечения гризеофульвином больные принимали рыбий жир. Большинство их принимало гризеофульвин в течение трех недель ежедневно, а затем через день до окончания курса лечения. Часть больных принимала гризеофульвин ежедневно в течение всего курса лечения. Длительность лечения — 45 — 60 дней.

Всем больным, леченным гризеофульвином, применялась одновременно и местная терапия. Один раз в неделю волосы сбривались, два раза проводилось мытье головы с мылом. Подно-мазевое лечение применялось по обычной методике. Такая комплексная терапия ускоряет сроки излечения и сокращает пребывание больного в стационаре. В процессе и после окончания лечения гризеофульвином у всех больных проводилось систематическое исследование волос на грибки. Один раз в 10 дней делались анализы крови и мочи.

Закончили лечение и сняты с учета 66 человек, находятся на контроле — 6. Лечение оказалось неэффективным у 1 больного. Рецидив наступил у 2 больных. Лечение гризеофульвином больные переносили хорошо. Побочных явлений не наблюдалось. Существенных изменений со стороны крови не отмечено. Исчезновение грибков у отдельных больных наступило на 9—11-й день, в основном на 20—25-й, реже после 26-го дня от начала приема гризеофульвина.

Наши наблюдения согласуются с литературными данными и подтверждают эффективность отечественного гризеофульвина в терапии больных дерматомикозами. Возможность его широкого применения не только в условиях клиники, но и в условиях района и врачебного участка будет способствовать проведению более успешной борьбы с грибковыми заболеваниями.