

ЛЕЧЕНИЕ МИКОЗОВ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЭПИЛИНОВЫМ ПЛАСТЫРЕМ

Л. И. БОГДАНОВИЧ, А. А. РАБИНОВИЧ,
А. Г. КЛЕВАНОВИЧ

Из кафедры кожно-венерических болезней
(зав. — проф. Л. И. Богданович)

1. В области изыскания безрентгеновских методов лечения трихомикозов большим вкладом явилось создание отечественного препарата эпилина.

2. Новый отечественный препарат — эпилин — в Витебской областной кожно-венерологической больнице начал применяться в 1960 году.

3. Эпилиновый пластырь нами был применен по методике проф. А. М. Ариевича у 61 больного трихомикозами, из них трихофития была у 54, фавус — у 7. У 18 больных рентгеновская эпиляция была противопоказана по возрасту и другим причинам.

4. Лечение закончили и сняты с учета 29 человек, закончили лечение и находятся под наблюдением 17 человек, продолжают лечение — 14. Рецидив — 1.

5. Качество эпиляции было хорошим у 45 больных, удовлетворительным — у 16.

6. В процессе применения эпилинового пластыря отмечены следующие побочные явления: конъюнктивит и блефарит — у 5 больных, высыпание фолликулярных узелков на лице — у 7, на лице и конечностях — у 2, повышенная нервная возбудимость — у 2, головная боль — у 3.

7. Применение эпилинового пластыря с последующей йодно-мазевой терапией является эффективным безрентгеновским методом лечения микозов волосистой части головы.