

О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АМИНАЗИНОМ И ЕГО КОМБИНАЦИЕЙ С ИНСУЛИНОМ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ¹

Н. В. Виноградов и Н. К. Ткаченко

Кафедра психиатрии (зав. — проф. Н. В. Виноградов) Витебского
медицинского института

Высказываемые в литературе мнения о преимуществе лечения одним аминазином или в сочетании его с инсулином противоречивы.

В работе Р. А. Алексанянц [1] и Т. А. Невзоровой [2] не дается определенного ответа на этот вопрос. Второй автор скорее склоняется к мнению, что одновременное применение инсулина и аминазина менее эффективно. Правда, под его наблюдением было сравнительно небольшое число больных, получавших комбинированное лечение (20).

Мы поставили перед собой задачу изучить результаты лечения аминазином в сочетании с инсулинотерапией на сравнительно большом числе больных шизофренией. Это было тем более интересным, что мы располагали нами же разработанными результатами лечения 87 больных шизофренией одним только аминазином.

Больные получали 2,5% раствор аминазина внутримышечно на фоне шоковых и субшоковых гипогликемических состояний, вызванных инсулином. Последний вводили в 9 часов утра; около 14 часов производили обычное купирование; аминазин вводили в 16 и 22 часа (суточная доза от 50 до 200 мг, в большинстве случаев не менее 150 мг).

Т. А. Невзорова [2] в ряде случаев назначала инъекции аминазина, через день.

Всего комбинированную терапию (инсулин + аминазин) получало 69 больных шизофренией: 39 — с параноидной и галлюцинаторно-параноидной формой, 17 — с кататонической, 6 — с гебефренической, 6 — с простой, один — с ипохондрической формой.

У большинства больных длительность заболевания была от 1½ до 3 лет, у 10 — от нескольких месяцев до 1 года, у 6 — больше 3 лет.

Результаты комбинированного лечения представлены в табл. 1.

Одним аминазином лечили 87 больных шизофренией: 37 — с параноидной и галлюцинаторно-параноидной формой, 22 — с кататонической, 9 — с гебефренической, 9 — с простой и 10 — с ипохондрической формой.

Длительность заболевания в большинстве случаев — от 1 года до 3 лет, у 22 — от нескольких месяцев до 1 года и у 15 — более 3 лет.

Результаты лечения одним аминазином представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 1 и 2, из 69 больных шизофренией, леченных комбинированным методом, ремиссия наступила у 95,63%; при лечении же одним аминазином ремиссия наблюдалась у 70,11% больных. Кроме того, при комбинированном методе ремиссия типа А наступила у 23,18% больных шизофренией, а при лечении одним аминазином — только у 8,04%.

¹ Доложено на заседании Научного общества невропатологов и психиатров Витебской области.

Таблица 1
Результаты лечения аминазином в сочетании
с инсулином по формам шизофрении

Форма шизофрении	Тип ремиссии				
	A	B	C	D	O
	число больных				
Параноидная и галлюцина- торно-параноидная	14	4	11	8	2
Кататоническая	1	1	7	7	1
Гебефреническая	0	0	3	3	0
Простая	1	1	3	1	0
Ипохондрическая	0	1	0	0	0
Всего	16	7	24	19	3

Таблица 2
Результаты лечения одним аминазином по формам
шизофрении

Форма шизофрении	Тип ремиссии				
	A	B	C	D	O
	число больных				
Параноидная и галлюцина- торно-параноидная	4	5	10	11	7
Кататоническая	2	3	2	5	10
Гебефреническая	0	0	3	5	1
Простая	0	0	1	3	5
Ипохондрическая	1	2	4	0	3
Всего	7	10	20	24	26

В нашем клиническом архиве мы подобрали истории болезни 49 больных шизофренией, леченных одним инсулином. Давность заболевания соответствовала таковой в приведенных выше группах больных.

Ремиссия типа А наступила у 7 больных, В — у 7, С — у 6, D — у 13, O — у 16 больных.

Как видно из приведенного материала, комбинированный метод лечения больных шизофренией (аминазин + инсулин) является наиболее эффективным. Как при лечении одним аминазином, так и при комбинированной терапии наилучшие результаты наблюдаются при параноидной и галлюцинаторно-параноидной форме шизофрении.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексанянц Р. А. Ж. невропатол., 1959, т. 59, в. 2, стр. 167. — 2. Невзорова Т. А. Там же, стр. 160.

Поступила 5/XI 1961 г.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAITEMENT ASSOCIÉ PAR L'AMINAZINE ET L'INSULINE DES MALADES SCHIZOPHRÈNES

Par N. V. Vinogradov et N. K. Tkatchenko

Résumé

Les auteurs ont appliqué le traitement associé de l'aminazine avec l'insuline à 69 malades schizophrènes et ont observé des rémissions dans 95,64% de cas. Les malades avec des rémissions du type „A“, „B“, „C“ étaient sortis de l'hôpital mais 48,90%, c'est à dire presque la moitié sont entrés réitérativement dans la clinique à cause d'une récidence, qui était survenue au cours de la première année après le traitement.